

# Re5 depressionsbehandling med T-PEMF

## Indikation, kontraindikationer, effekt & bivirkninger

### Indikation

Re5 depressionsbehandling er indiceret til patienter med moderat og svær depression som en såkaldt 'anden linje' og non-farmakologisk behandlingsmulighed, for de patienter der ikke oplever tilstrækkelig effekt eller uacceptable bivirkninger af deres første behandlingsforsøg. Re5 depressionsbehandlingen kan anvendes hjemme, på hospitaler og i privat lægepraksis.

### Kontraindikationer

- Kræft i hjernen, nakken eller hovedområdet
- Patienter med aktive medicinske implantater
- Epilepsi
- Alkoholisme
- Stofmisbrug
- Åbent sår i hovedbunden
- Alvorlige psykopatologiske forstyrrelser\*
- Graviditet

*\*Alvorlige psykopatologiske forstyrrelser dækker over eks. svær skizofreni eller anden svær psykisk sygdom, der gør patienten ude af stand til at gennemføre behandlingsforløbet.*

### Effekt & Bivirkninger

De kliniske studier med Re5 depressionsbehandling har vist at mere end 60 procent af de behandlede patienter efter 8 ugers behandling opnåede fuldstændig symptomfrihed eller en betydelig forbedring af deres depressionssymptomer.

Blandt dem, der opnåede fuld symptomfrihed, forblev effekten hos over halvdelen af patienterne to år efter behandlingen. For dem, der oplevede et tilbagefald, viste en gentagelse af behandlingsforløbet sig at være meget effektivt.

Meget få bivirkninger er blevet rapporteret i forbindelse med de gennemførte kliniske studier. Der kan forekomme mild hovedpine og / eller kvalme kort tid efter de første behandlinger. Disse bivirkninger ophører hurtigt. Der er ikke registeret andre former for bivirkninger i forbindelse med Re5 depressionsbehandling.